

DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO

Datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS), del 2015 al 2018, correspondientes a adultos en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia: Personas de 45 años o más

1 de cada 9

personas de 45 años o más presenta

Deterioro Cognitivo Subjetivo



EL DETERIORO COGNITIVO SUBJETIVO consiste en **PROBLEMAS DE LA MEMORIA** autorreportados que han **EMPEORADO** a lo largo del último año.

El 40 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tuvieron que abandonar sus actividades diarias



El 81 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo tienen al menos una afección crónica. El deterioro cognitivo subjetivo podría hacerla más difícil de manejar

Una de cada tres

personas con deterioro cognitivo subjetivo dice que interfiere con sus actividades sociales, trabajo o tareas de voluntariado



Menos de la mitad

de las personas con deterioro cognitivo subjetivo han hablado sobre sus síntomas con un proveedor de atención médica



El 35 % de las personas con deterioro cognitivo subjetivo necesitan ayuda con las tareas del hogar



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

alzheimer's association®

cdc.gov/aging

alz.org/publichealth