



**Descargo de responsabilidad:** Actualmente, se están realizando importantes actualizaciones al sitio en español sobre COVID-19 que podrían generar demoras en la traducción del contenido. Le pedimos disculpas por los inconvenientes.

# Possibles efectos secundarios después de vacunarse contra el COVID-19

Actualizado el 5 de ago. del 2022

La vacunación contra el COVID-19 ayuda a proteger a las personas de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Después de recibir cualquier vacuna, incluida la vacuna contra el COVID-19, pueden aparecer efectos secundarios y reacciones adversas.

**Efectos secundarios:** [no todas las personas tienen efectos secundarios](#). Sin embargo, algunas personas sí. Los efectos secundarios son signos normales de que su organismo está generando protección. Los efectos secundarios pueden afectar su capacidad para desempeñar sus actividades diarias, y [deberían desaparecer en pocos días](#). Si quiere notificar un efecto secundario, hágalo a través de [V-safe](#).

**Reacciones adversas:** [las reacciones adversas](#) son poco frecuentes, pero podrían causar un problema de salud a largo plazo. En el caso de que ocurra una reacción adversa, por lo general ocurrirá [dentro de las seis semanas posteriores a la administración de la vacuna](#). Si quiere notificar una reacción adversa, hágalo a través del [Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas \(VAERS\)](#).

- Durante los ensayos clínicos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) recopiló datos de todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas por un mínimo de dos meses (ocho semanas) después de la última dosis.
- En este momento, los CDC, la FDA y otras agencias federales continúan [monitoreando la seguridad de las vacunas contra el COVID-19](#).

## Efectos secundarios comunes

### En el brazo donde recibió la vacuna inyectable:



- Dolor
- Enrojecimiento
- Hinchazón

### En el resto del cuerpo:



- Cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- Escalofríos
- Fiebre
- Náuseas

[Las reacciones alérgicas graves](#) después de vacunarse contra el COVID-19 son poco frecuentes. Las personas que tuvieron una reacción alérgica grave después de recibir una vacuna de ARNm contra el COVID-19 (Pfizer-BioNTech o Moderna) no deberían recibir otra dosis de ninguna vacuna de ARNm contra el COVID-19. Las personas que tuvieron una reacción alérgica grave después de haber recibido la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson Janssen (J&J/Janssen) no deben recibir otra dosis de esa vacuna.

de esa vacuna.

Obtenga información sobre [recibir otro tipo de vacuna contra el COVID-19 después de una reacción alérgica](#).

## Consejos útiles para aliviar los efectos secundarios

### Para reducir el dolor y la molestia cuando aplican la inyección



- Aplique un paño limpio, frío y húmedo sobre el área.
- Use o ejercite su brazo.

### Para reducir las molestias provocadas por la fiebre



- Beba mucho líquido.
- Use ropa liviana.

Para tratar cualquier dolor o molestia que tenga [después de vacunarse](#), consulte con su médico acerca de tomar medicamentos sin receta médica, como ibuprofeno, acetaminofeno, aspirina (solo para personas de 18 años de edad o más) o antihistamínicos.

- Lo que [no se recomienda](#) es tomar estos medicamentos antes de vacunarse con el fin de intentar evitar los efectos secundarios.
- Las personas pueden tomar estos medicamentos para aliviar los efectos secundarios de la vacunación si no tienen otros motivos médicos que les impidan tomarlos.
- Consulte al proveedor de atención médica de su hijo para saber si puede darle un analgésico que no contenga aspirina y sobre otras medidas que puede tomar en casa para que su hijo se sienta más cómodo después de vacunarse.

## Luego de la segunda dosis o la dosis de refuerzo

Los efectos secundarios después de recibir la [segunda dosis](#) pueden ser más intensos que los que sufre después de la primera. Estos efectos secundarios son **signos normales** que indican que el organismo está **generando protección** y deberían desaparecer en pocos días.

Por el momento, las reacciones notificadas después de recibir una [dosis de refuerzo](#) son similares a las notificadas con los esquemas principales de una y dos dosis. **La mayoría de los efectos secundarios fueron de leves a moderados.**

Los efectos secundarios notificados con mayor frecuencia fueron:

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Dolor en el lugar de la inyección

## Cuándo hay que llamar al médico por un efecto secundario

En la mayoría de los casos, la molestia del dolor o la fiebre son un signo normal de que el organismo está creando protección. Los efectos secundarios pueden afectar su capacidad o la de su hijo de realizar sus actividades cotidianas, pero deberían desaparecer en pocos días. Contacte a un médico o proveedor de atención médica:



- Si la irritación o la sensibilidad en la zona de la inyección [empeoran pasadas las 24 horas](#)
- Si los efectos secundarios [le preocupan o al parecer no están desapareciendo al cabo de algunos días](#)

Si usted o su hijo se vacunan contra el COVID-19 y cree que pueden estar teniendo una [reacción alérgica grave](#) una vez que se fueron del centro de vacunación, **llame al 911 y solicite atención médica de inmediato**.

Obtenga información sobre [recibir otro tipo de vacuna contra el COVID-19 después de una reacción alérgica](#).

## Si no tiene efectos secundarios

Las reacciones luego de vacunarse contra el COVID-19 pueden variar de una persona a otra. La mayoría de las personas que participaron en los ensayos clínicos experimentaron solo efectos secundarios leves, y algunas de ellas no tuvieron ningún efecto secundario en absoluto. De todas maneras la respuesta de esas personas a la vacuna fue sólida. **La vacunación evita que tenga una infección grave por COVID-19, independientemente de si se presentan o no los efectos secundarios después de vacunarse.**

## Notificación de efectos secundarios y reacciones adversas

**V-safe** le permite hacer chequeos de salud personalizados y confidenciales por mensaje de texto y responder cuestionarios web para poder compartir con los CDC de manera rápida y fácil información sobre cómo se sienten usted o su dependiente después de vacunarse contra el COVID-19.

Si quiere notificar una reacción adversa, un efecto secundario o una reacción a la vacuna contra el COVID-19, use el [Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas \(VAERS\)](#) .



**What to Expect after Getting a COVID-19 Vaccine**  
Acceso directo: <https://www.cdc.gov/acip/covid-19-vaccine-side-effects.html>

COVID-19 vaccination will help protect you from getting COVID-19. You may have some side effects, which are normal signs that your body is building protection. These side effects may affect your ability to do daily activities, but they should go away in a few days. Some people have no side effects.

**Common side effects**

On the arm where you got the shot:

- Pain
- Redness
- Swelling

Throughout the rest of your body:

- Tiredness
- Chills
- Headache
- Fever
- Muscle pain
- Nausea

**Helpful tips**

If you have pain or discomfort after getting your vaccine, talk to your doctor about taking an over-the-counter medicine, such as ibuprofen or acetaminophen.

To reduce pain and discomfort where you got the shot:

- Apply a clean, cool, wet washcloth over the area.
- Use an ice pack.
- Dress lightly.

To reduce discomfort from fever:

- Drink plenty of fluids.

Ask your vaccination provider

## Qué esperar luego de recibir la vacuna contra el COVID-19

Hoja informativa para trabajadores de la salud después de la vacunación.

Detalles del archivo: 199 KB, 1 página

[Ver PDF en inglés](#) 

[Otros idiomas](#)

## Más información

[Garantizar la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 en los Estados Unidos](#)

[Beneficios de vacunarse contra el COVID-19](#)

[Vacunas contra el COVID-19 para niños y adolescentes](#)

[Cómo protegerse y proteger a los demás](#)

[Seguridad de las vacunas contra el COVID-19](#)