



COVID-19

Descargo de responsabilidad: Actualmente, se están realizando importantes actualizaciones al sitio en español sobre COVID-19 que podrían generar demoras en la traducción del contenido. Le pedimos disculpas por los inconvenientes.

Vacunas contra el COVID-19 para personas con inmunodepresión moderada o grave

Actualizado el 2 de sep. del 2022

Lo que necesita saber

- Si tiene [inmunodepresión moderada o grave](#) (sistema inmunitario debilitado) corre mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir a causa del COVID-19. Además, es posible que la respuesta inmunitaria a la vacuna contra el COVID-19 de su organismo no sea tan fuerte como la respuesta de las personas que no están inmunodeprimidas.
- Al igual que con las vacunas para otras enfermedades, para tener la mayor protección debe mantener su esquema de vacunación contra el COVID-19 al día, como se describe abajo.
 - CDC recommends everyone ages 12 years and older get an updated COVID-19 booster to help restore protection that has decreased since your last vaccine, and provides improved protection against newer variants. Updated boosters, also known as bivalent boosters, target the most recent Omicron subvariants, known as BA.4 and BA.5, in addition to the original SARS-CoV-2.
- Con la [herramienta de ayuda con el refuerzo de las vacunas contra el COVID-19](#), puede averiguar si le corresponde recibir una dosis de refuerzo y cuándo para mantenerse al día con sus vacunas contra el COVID-19. You may also be eligible for Evusheld, a medicine given by your healthcare provider every six months to help prevent you from getting COVID-19.
- You can self-attest to your moderately or severely immunocompromised status, which means you do not need any documentation of your status in order to receive COVID-19 vaccine or booster doses, wherever they are offered.

Preadolescentes, adolescentes y adultos con inmunodepresión moderada o grave

Pfizer-BioNTech



GRUPO DE EDAD

12 AÑOS DE EDAD O MÁS

1.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

3 semanas después de la 1.ª dosis

3.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

Al menos 4 semanas después de la 2.ª dosis

4.^a dosis

UPDATED BOOSTER

At least 2 months after 3rd dose or last booster, and can only be Pfizer-BioNTech

Up to Date: Immediately after the most recent booster recommended for you ^[1]

Moderna

GRUPO DE EDAD

18 AÑOS DE EDAD O MÁS

1.^a dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.^a dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

4 semanas después de la 1.^a dosis

3.^a dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

Al menos 4 semanas después de la 2.^a dosis

4.^a dosis

UPDATED BOOSTER

At least 2 months after 3rd dose or last booster, and can be Pfizer-BioNTech or Moderna

Up to Date: Immediately after the most recent booster recommended for you ^[1]

GRUPO DE EDAD

DE 12 A 17 AÑOS

1.^a dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.^a dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

4 semanas después de la 1.^a dosis

3.^a dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

Al menos 4 semanas después de la 2.^a dosis

4.^a dosis

UPDATED BOOSTER

At least 2 months after 3rd dose or last booster, and can only be Pfizer-BioNTech

Up to Date: Immediately after the most recent booster recommended for you ^[1]



GRUPO DE EDAD

18 AÑOS DE EDAD O MÁS

1.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.ª dosis

DOSIS ADICIONAL

Al menos 4 semanas después de la 1.ª dosis y debería ser de Pfizer-BioNTech o Moderna

3.ª dosis

UPDATED BOOSTER

At least 2 months after 2nd dose or last booster, and can be Pfizer-BioNTech or Moderna

Up to Date: Immediately after you have received the most recent booster recommended for you ^[1]



GRUPO DE EDAD

18 AÑOS DE EDAD O MÁS

1.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

3 semanas después de la 1.ª dosis

3.ª dosis

UPDATED BOOSTER

Al menos 2 meses después de la 2.ª dosis, y puede ser Pfizer-BioNTech o Moderna

Up to Date: Immediately after you have received the most recent booster recommended for you ^[1]

GRUPO DE EDAD

DE 12 A 17 AÑOS

1.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

3 semanas después de la 1.ª dosis

3.ª dosis

UPDATED BOOSTER

At least 2 months after 2nd dose and can only be Pfizer-BioNTech

Up to Date: Immediately after you have received the most recent booster recommended for you ^[1]

Niños de 6 meses a 11 años de edad con inmunodepresión moderada o grave



GRUPO DE EDAD

DE 5 A 11 AÑOS

1.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

3 semanas después de la 1.ª dosis

3.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

Al menos 8 semanas después de la 2.ª dosis

4.ª dosis

DOSIS DE REFUERZO

Al menos 3 meses después de la 3.ª dosis

Up to Date: Immediately after you have received the most recent booster recommended for you ^[1]

GRUPO DE EDAD

DE 6 MESES A 4 AÑOS

1.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

3 semanas después de la 1.ª dosis

3.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

Al menos 8 semanas después de la 2.ª dosis

Estar al día: 2 semanas después de la 3.ª dosis en el esquema principal, ya que por el momento no se recomienda una dosis de refuerzo para este grupo de edad

Moderna

GRUPO DE EDAD

DE 6 MESES A 11 AÑOS

1.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

2.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

4 semanas después de la 1.ª dosis

3.ª dosis

ESQUEMA PRINCIPAL

Al menos 4 semanas después de la 2.ª dosis

Estar al día: 2 semanas después de la 3.ª dosis en el esquema principal, ya que por el momento no se recomiendan dosis de refuerzo para ningún niño que haya completado el esquema principal con la vacuna contra el COVID-19 de Moderna

¹ Si completó su esquema principal pero todavía no es elegible para una dosis de refuerzo, también se considera que está al día con sus vacunas.

Para encontrar centros cercanos de vacunación contra el COVID-19: visite [vacunas.gov](https://www.vacunas.gov), envíe su código postal al 438829 o llame al 1-800-232-0233.

¿Cómo saber si una persona tiene compromiso inmunitario moderado o grave?

Se considera que las personas padecen [inmunodepresión moderada o grave](#) (tienen el sistema inmunitario debilitado) debido a varios tipos de afecciones y tratamientos. Los ejemplos incluyen:

- Personas en tratamiento oncológico para tumores o cánceres en la sangre
- Personas que recibieron un trasplante de órgano y están tomando medicamentos inmunodepresores
- Personas que recibieron terapia de linfocitos T con receptores quiméricos de antígenos (CAR), un tratamiento para ayudar a su sistema inmunitario a anexarse a las células cancerígenas y matarlas
- Personas con inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich)
- Personas con infección avanzada o no tratada por VIH
- Active treatment with high-dose corticosteroids or other drugs that may suppress the immune response

Consulte con su proveedor de atención médica acerca de las vacunas contra el COVID-19 y su afección.

Si tiene inmunodepresión moderada o grave, o una alergia grave a las vacunas contra el COVID-19, podría ser elegible para acceder al [Evusheld](#), a medicine given every six months by your healthcare provider **to help prevent you from getting COVID-19**. Hable con su proveedor de atención médica para saber si es la opción correcta para usted.

Personas que se vacunaron fuera de los Estados Unidos

Las personas con inmunodepresión moderada o grave que se vacunaron contra el COVID-19 con vacunas que no están disponibles en los Estados Unidos deberían completar o reiniciar el esquema de vacunación contra el COVID-19 recomendado, incluida una dosis de refuerzo, en los Estados Unidos. Para obtener más información, consulte con su proveedor de atención médica o vea las [consideraciones clínicas provisionales sobre el COVID-19](#).

Preguntas frecuentes

¿Se puede combinar las vacunas de ARNm en el esquema principal de vacunación? 

No, las vacunas del esquema principal de vacunación deben ser las mismas o de la misma marca. However, if the mRNA vaccine product given for the first two doses is not available or is unknown, either Pfizer-BioNTech or Moderna COVID-19 vaccine (mRNA COVID-19 vaccines) may be administered for the third primary dose.

¿Cuáles son los beneficios de una tercera dosis principal para las personas con inmunodepresión moderada o grave que recibieron dos dosis de una vacuna contra el COVID-19 de ARNm? 

Una dosis principal adicional puede ayudar a prevenir el COVID-19 grave y potencialmente letal en personas que pueden no haber respondido a su esquema principal de dos dosis de vacunas contra el COVID-19 de ARNm. Es posible que la respuesta inmunitaria de las personas con inmunodepresión moderada o grave que tienen protección baja o no tienen protección después de haber recibido dos dosis de una vacuna de ARNm mejore después de una tercera dosis principal de la misma vacuna.

¿Cuáles son los riesgos de vacunar a personas con inmunodepresión moderada o grave con una tercera dosis principal? 

Se sigue evaluando la seguridad, efectividad y beneficios de la tercera dosis principal en personas con inmunodepresión moderada o grave. Hasta el momento, las reacciones notificadas después de una tercera dosis principal de una vacuna contra el COVID-19 de ARNm son similares a las del esquema principal de dos dosis. Los efectos secundarios más notificados fueron fatiga y dolor en la zona de la inyección y, en general, la mayoría de los síntomas fueron leves a moderados.

Al igual que con el esquema principal de dos dosis, los [efectos secundarios graves son poco frecuentes](#), pero pueden ocurrir.

¿Cuál es la diferencia entre una tercera dosis principal y una dosis de refuerzo? ^

Para las personas inmunodeprimidas, la tercera dosis principal es la última dosis del esquema principal de vacunación con una vacuna de ARNm contra el COVID-19. Las dosis de refuerzo mejoran o restauran la protección contra el COVID-19 que podría haber disminuido con el paso del tiempo.

¿Cuándo se considera que las personas con sistemas inmunitarios debilitados están al día con las vacunas contra el COVID-19? ^

If you are moderately or severely immunocompromised, being up to date means you have completed a primary series and received the most recent booster dose recommended for you by CDC.

You are also considered up to date if,

- Completó su esquema principal de vacunación, pero aún no es elegible para recibir la dosis de refuerzo
-

¿Las personas con el sistema inmunitario debilitado deben presentar un comprobante de su inmunodepresión moderada o grave para poder vacunarse? ^

Las personas pueden firmar una declaración jurada donde conste que tienen inmunodepresión moderada o grave. Esto significa que no es necesario que presenten ninguna documentación de su estado para poder recibir las dosis correspondientes de la vacuna contra el COVID-19 donde estén disponibles.



Para atención médica y salud pública

- [Uso de las vacunas contra el COVID-19 actualmente autorizadas o aprobadas en los Estados Unidos](#)

Última actualización: 2 de sept. del 2022