

Trois conseils destinés aux personnes atteintes de drépanocytose pour utiliser sans risque les médicaments

Lien accessible : <https://www.cdc.gov/hcbddd/sicklecell/betterhealthtoolkit/index.html>




Les personnes atteintes de drépanocytose se voient souvent prescrire des médicaments pour les complications fréquentes de la drépanocytose. Si votre prestataire vous prescrit un médicament, suivez ces étapes :



Interrogez votre prestataire sur les bénéfices et les risques de votre médicament.

Bien que les médicaments puissent avoir des bénéfices salutaires, ils présentent parfois des risques. Il est important de s'informer sur ces deux aspects avant de commencer à prendre votre médicament.



Prenez votre médicament exactement de la façon prescrite.

Il est important de prendre la bonne quantité, au bon moment et de la bonne manière. Si vous ne le faites pas, cela pourrait nuire gravement à votre santé. Si, pour quelque raison que ce soit, vous éprouvez des difficultés à suivre votre plan de traitement, parlez-en à votre prestataire.



Signalez tout effet secondaire de votre médicament.

Si vous présentez des effets secondaires liés à votre médicament, signalez-les à votre prestataire de manière à ce qu'il/elle puisse traiter ces effets secondaires et modifier votre plan de traitement, si nécessaire.

Consultez la trousse à outils « Drépanocytose: des mesures pour une meilleure santé » disponible ici : www.cdc.gov/SCD/betterhealth

Source: Liem RI, Lanzkron S, D Coates T, DeCastro L, Desai AA, Ataga KI, et. al. American Society of Hematology 2019 guidelines for sickle cell disease: cardiopulmonary and kidney disease. *Blood Adv*. 2019 Dec 10;3(23):3867-3897.



Centers for Disease Control and Prevention
National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities



SCDC
SICKLE CELL DATA COLLECTION