

Médicaments destinés à la prévention du paludisme en voyage

Atovaquone-Proguanil (Malarone™)

Qu'est-ce que l'atovaquone-proguanil ?

L'atovaquone-proguanil est une association de deux médicaments, l'atovaquone et le proguanil, dans un seul comprimé. Elle est disponible aux États-Unis uniquement sur ordonnance. Elle est commercialisée sous le nom de marque Malarone et également comme médicament générique en deux tailles :

Comprimé pour adulte : 250 mg d'atovaquone plus 100 mg de proguanil

Comprimé pédiatrique : 62,5 mg d'atovaquone plus 25 mg de proguanil

L'atovaquone-proguanil peut être prescrite soit pour la prévention, soit pour le traitement du paludisme.

Cette fiche fournit des informations concernant son utilisation à des fins de prévention contre l'infection au paludisme pendant un voyage.



Qui peut prendre de l'atovaquone-proguanil ?

L'atovaquone-proguanil peut être prescrite aux adultes et aux enfants qui pèsent au moins 5 kg (11 lb).

Qui ne doit pas prendre d'atovaquone-proguanil ?

Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent des enfants en bas âge de moins de 5 kg, ou les enfants en bas âge qui pèsent moins de 5 kg ne doivent pas prendre d'atovaquone-proguanil. Par ailleurs, les personnes souffrant d'une grave maladie des reins ne doivent pas prendre d'atovaquone-proguanil.

Comment dois-je prendre l'atovaquone-proguanil ?

Aussi bien les adultes que les enfants doivent prendre une dose d'atovaquone-proguanil par jour en commençant un ou deux jours avant le déplacement dans la zone propice à la transmission du paludisme. Ils doivent prendre une dose par jour une fois qu'ils y sont, puis pendant 7 jours consécutifs après avoir quitté la région concernée. Dans des rares cas (par exemple, si vous cessez de consommer un autre médicament antipaludéen pour prendre de l'atovaquone-proguanil), votre médecin peut vous demander de le prendre pendant une longue période.

La dose journalière pour adultes est d'un seul comprimé adulte.

La dose journalière pour les enfants dépend de leur poids. La liste ci-dessous indique la dose journalière des enfants en fonction de leur poids :

Les enfants pesant entre 5 et 8 kg doivent prendre un ½ comprimé pédiatrique chaque jour,

> 8–10 kg : ¾ de comprimé pédiatrique chaque jour

> 10–20 kg : 1 comprimé pédiatrique chaque jour

> 20–30 kg : 2 comprimés pédiatriques chaque jour

> 30–40 kg : 3 comprimés pédiatriques chaque jour

> 40 kg : 1 comprimé adulte chaque jour

L'atovaquone-proguanil doit être prise pendant les repas ou avec une boisson lactée.


Où puis-je acheter l'atovaquone-proguanil ?

Les médicaments antipaludéens sont disponibles aux États-Unis uniquement sur ordonnance. Les médicaments doivent être achetés en pharmacie avant le voyage plutôt que dans le pays de destination. L'achat de médicaments à l'étranger présente un risque : les médicaments peuvent être de mauvaise qualité, contaminés ou contrefaits et ne pas vous protéger contre le paludisme.

Dans quelles régions du monde l'atovaquone-proguanil peut-elle être utilisée pour la prévention des voyageurs contre le paludisme ?

Actuellement, l'atovaquone-proguanil peut être prise dans toutes les régions du monde où sévit le paludisme.

Le CDC note tous les endroits au monde qui sont propices à la transmission du paludisme et le type d'antipaludéen recommandé pour chaque région. Il est possible d'accéder à ces informations à l'aide de la carte du paludisme disponible sur le site du CDC : <http://www.cdc.gov/malaria/map/index.html>.



Atovaquone-Proguanil (Malarone™)

Le paludisme est une maladie grave qui peut causer la mort si elle n'est pas traitée immédiatement. Il est causé par un germe capable d'infecter un certain type de moustique qui se nourrit du sang des êtres humains.

Environ 1 500 cas de paludisme sont découverts chaque année aux États-Unis presque tous chez des sujets qui voyagent dans les régions du monde où le paludisme sévit.

Y aura-t-il une interaction entre l'atovaquone-proguanil et mes autres médicaments ?

Certains autres médicaments peuvent interagir avec l'atovaquone-proguanil et causer des problèmes dans votre cas. Votre médecin est chargé d'évaluer ces autres médicaments que vous prenez pour s'assurer qu'il n'existe aucune interaction entre ces derniers et l'atovaquone-proguanil. Dans certains cas, les médicaments peuvent faire l'objet d'ajustement pour réduire l'interaction au minimum. Vous pouvez également demander à votre pharmacien de vérifier s'il existe des interactions avec d'autres médicaments.

Par exemple, les personnes qui prennent un médicament anticoagulant appelé Coumadin peuvent être exposées à un risque élevé d'hémorragie si elles prennent de l'atovaquone-proguanil. La dose de Coumadin doit être ajustée, ce qui vous permet de prendre les deux médicaments sans aucun risque.

Quels sont les éventuels effets secondaires de l'atovaquone-proguanil ?

L'atovaquone-proguanil est bien tolérée et ses effets secondaires sont rares. Les réactions négatives les plus fréquemment signalées sont les douleurs gastriques, la nausée, les vomissements et les maux de tête. Ces effets secondaires peuvent parfois être atténués en prenant l'atovaquone-proguanil lors des repas.

Tous les médicaments peuvent comporter des effets secondaires. Les effets secondaires bénins, tels que la nausée, les vomissements occasionnels ou la diarrhée, ne nécessitent pas d'ordinaire l'arrêt des médicaments antipaludéens. Si vous êtes allergique à votre antipaludéen, consultez votre professionnel de la santé ; il existe d'autres médicaments antipaludéens.

Autres considérations

- Bonne pour les voyageurs de dernière minute parce que la prise du médicament commence 1 à 2 jours avant le voyage vers une région propice à la transmission du paludisme
- Bon choix pour les voyages de courte durée parce que vous ne devez prendre le médicament que pendant 7 jours après le voyage au lieu de 4 semaines
- Tend à coûter plus cher que certaines des autres possibilités (surtout pour les voyages de longue durée)

Pendant combien de temps l'utilisation de l'atovaquone-proguanil est sans risque ?

Le CDC ne fixe pas de limite à l'utilisation de l'atovaquone-proguanil à titre préventif contre le paludisme. Il n'y a aucune preuve d'effets nocifs lorsque le médicament a été utilisé pendant de longues périodes.

Pour tout renseignement complémentaire :

Consultez le site Web du CDC consacré au paludisme à l'adresse www.cdc.gov/malaria

Les professionnels de la santé qui ont besoin d'une assistance en matière de diagnostic ou de gestion des cas suspects de paludisme doivent appeler la ligne d'urgence mise sur pied par le CDC pour le paludisme : 770-488-7788 or 855-856-4713 gratuite (du lundi au vendredi, de 9h à 17h, heure de l'Est).

Pour les consultations d'urgence après les heures ouvrables, appelez le numéro : 770-488-7100 demandez à parler à un clinicien du Département CDC du paludisme.

Prévenir le paludisme

- **Prendre un antipaludéen.**
- **Éviter les piqûres de moustiques.**
- **Si vous tombez malade, consultez immédiatement un médecin.**