

Influenza (gripe)



Influenza (gripe)

Influenza (gripe) Inicio

Situación actual de la influenza aviar H5N1 en mamíferos



Antecedentes

Aunque no es común, los mamíferos pueden infectarse por virus de la HPAI (forma altamente patógena de la influenza aviar) A(H5N1) ("influenza aviar H5N1"). Los informes de estas infecciones esporádicas en mamíferos se han producido en todo el mundo en medio de brotes generalizados de infecciones de influenza aviar en aves silvestres y aves de corral.

Los mamíferos pueden infectarse por el virus de la influenza aviar H5N1 cuando comen aves infectadas, aves de corral u otros animales, y/o si están expuestos a ambientes contaminados con virus. Se cree que la propagación de los virus de la influenza aviar H5N1 de mamífero a mamífero no es tan frecuente, pero es posible.

Resumen de la situación en el país

En los Estados Unidos, desde el 2022, el APHIS del USDA ha notificado detecciones de virus A(H5N1) de la HPAI [en más de 200 mamíferos](#) [🔗](#). Más recientemente en los Estados Unidos se detectaron virus de influenza aviar A(H5N1) de la HPAI en cabras y ganado vacuno. El 25 de marzo del 2024, [se notificó por primera vez](#) [🔗](#) un brote de influenza aviar A(H5N1) de la HPAI en vacas lecheras de varios estados. Es la primera vez que se detectan estos virus de la influenza aviar en ganado vacuno. [Los CDC confirmaron un caso de infección por el virus A\(H5N1\) de la forma altamente patógena de la influenza aviar en humanos](#) que han estado expuestos a vacas lecheras en Texas presuntamente infectadas por el virus. Si bien no es muy frecuente, esta exposición al virus de influenza aviar A(H5N1) de la HPAI es el primer caso probable de transmisión de mamíferos a humanos.

Enlaces relacionados:

- [El USDA confirma la presencia de la influenza aviar altamente patógena en ganado lechero en Nuevo México | Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas](#) [🔗](#)
- [El USDA, la FDA y los CDC informan sobre detecciones de la forma altamente patógena de la influenza aviar en ganado lechero | Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas](#) [🔗](#)
- [Veterinarias y agencias de salud pública federales y estatales informan sobre la detección de la forma altamente patógena de la influenza aviar en ganado lechero de Kansas y Texas | Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas \(usda.gov\)](#) [🔗](#)
- [Detecciones de la HPAI \(forma altamente patógena de la influenza aviar\) en ganado | Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas \(usda.gov\)](#) [🔗](#)

- [Influenza: No solo para las aves \(usda.gov\)](#)  [286 KB, 1 página] 
- [Recomendaciones del APHIS por el virus H5N1 de la HPAI \(forma altamente patógena de la influenza aviar\) en ganado para funcionarios de sanidad animal, veterinarios acreditados y productores del 2 de abril del 2024](#)  [214 KB, 4 páginas] 
- [Infección por el virus de influenza aviar A \(H5N1\) altamente patógeno notificada en una persona en los EE. UU. | Sala de prensa en línea de los CDC | CDC](#)
- [Influenza aviar en mascotas y otros animales | Influenza aviar \(Influenza\) \(cdc.gov\)](#)
- [Actualización técnica: Summary Analysis of Genetic Sequences of Highly Pathogenic Avian Influenza A\(H5N1\) Viruses in Texas \(cdc.gov\)](#)

Resumen global

A nivel mundial, se han notificado infecciones esporádicas por virus de influenza aviar A(H5N1) en mamíferos de Asia, América del Norte, América del Sur y Europa. Puede encontrar más información acerca del impacto de la influenza aviar a nivel mundial aquí: [Influenza aviar - OMSA - Organización Mundial de Sanidad Animal](#) 

Específicamente, se han detectado infecciones recientes por virus A(H5N1) de la HPAI en mamíferos, como lobos marinos en Perú y Chile, elefantes marinos en Argentina y zorros en Canadá, Francia y otros países. Aquí puede consultar una lista de importantes brotes de influenza aviar de la HPAI, incluso en mamíferos: [Aspectos destacados de la cronología de la historia de la influenza aviar - 2020 a 2024 | Influenza aviar \(gripe aviar\) \(cdc.gov\)](#)

Riesgo para los seres humanos

La propagación geográfica generalizada de los virus H5N1 de la HPAI (forma altamente patógena de la influenza aviar) en aves silvestres, aves de corral y algunos otros mamíferos podría generar oportunidades adicionales para que las personas estén expuestas a estos virus. Por consiguiente, podría haber un aumento de casos esporádicos de infecciones en humanos a causa de la exposición a las aves y otros animales, aunque no haya aumentado el riesgo de transmisión de estos virus de las aves a las personas. Los CDC consideran que el riesgo actual de infección por los virus de influenza aviar para el público en general es bajo. Las personas que están expuestas a animales o aves infectadas debido a su trabajo u ocupación corren mayor riesgo de infección por el virus A(H5N1) de la HPAI. Los CDC tienen recomendaciones relacionadas con las pruebas de detección, el tratamiento de la infección por el virus A(H5N1) de la HPAI y la prevención de exposición a estos virus: [Virus de influenza aviar A\(H5N1\) altamente patógeno en animales: Recomendaciones provisionales para la prevención, el monitoreo y las investigaciones de salud pública | Influenza aviar \(gripe aviar\) \(cdc.gov\)](#)

Otras infecciones documentadas en mamíferos

En los últimos años, se han detectado infecciones por el virus H5N1 de la HPAI en mamíferos, incluidos, entre otros, animales salvajes, como zorros, osos y focas; animales domésticos o callejeros, como gatos y perros; animales de granja, como cabras, vacas y visones, y animales de zoológico, como tigres y leopardos. Aquí se puede ver la cronología de las detecciones de influenza aviar en mamíferos: [Aspectos destacados de la cronología de la historia de la influenza aviar - 2020 a 2024 | Influenza aviar \(gripe aviar\) \(cdc.gov\)](#)



Última revisión: 4 de abril del 2024

Error al procesar el archivo SSI