



Temporada de influenza 2023–2024 en los EE. UU.: estimaciones preliminares de la carga de la influenza durante la temporada

Las siguientes estimaciones corresponden a la actualización más reciente de la carga de la enfermedad durante la temporada 2023–2024, salvo que se produzca un cambio en la actividad durante la temporada estival. Los informes sobre estimaciones de carga preliminares para la temporada 2024–2025 se reanudarán en el otoño del 2024.

Los CDC estiman* que, entre el **1 de octubre del 2023** y el **15 de junio de 2024**, hubo:

35 a 65 millones
de **enfermos por influenza**




16 a 30 millones
de **consultas médicas por influenza**



390 000 – 830 000
casos de **hospitalizaciones por influenza**



25 000 – 72 000
casos de **muerte por influenza**



*Como la vigilancia de la influenza no cubre todos los casos de influenza que ocurren en los EE. UU., los CDC ofrecen estos rangos estimativos para reflejar mejor la carga general de la enfermedad. Estas estimaciones están calculadas con base en los datos recopilados a través de la Red de Vigilancia de Hospitalizaciones por Influenza (FluSurv-NET) de los CDC y son **preliminares**.

Esta página web incluye estimaciones preliminares semanales de cifras acumulativas de la temporada sobre los casos de influenza, consultas médicas, hospitalizaciones y muertes en los Estados Unidos. No es posible saber con exactitud la cantidad de personas que ha tenido influenza en los Estados Unidos porque no todas las personas que tienen influenza buscan atención médica o se realizan la prueba de detección de la influenza. Por ello, no todos los casos de influenza se identificarán a través de nuestros sistemas de vigilancia. Por este motivo, utilizamos modelos matemáticos para estimar el impacto de la influenza en la población. Los CDC han estimado la carga de la influenza desde el 2010 mediante un modelo matemático que tiene base en datos recolectados a través de la [Red de vigilancia de hospitalizaciones a causa de la influenza \(FluSurv-NET\)](#), una red que representa cerca del 9 % de la población de los EE. UU.

Además, los CDC evalúan todas las semanas la gravedad de la temporada actual y la información acerca de la evaluación de la gravedad de esta temporada se puede encontrar aquí: [Temporada de influenza en los Estados Unidos: evaluación preliminar de la gravedad durante la temporada](#).




Figure. Preliminary Upper and Lower Estimates of Cumulative Flu-Related Hospitalizations by Week for the 2023-2024 Flu Season Compared to Total Hospitalizations from Past Seasons

Todas las semanas, los CDC calculan la estimación más baja y la estimación más alta posibles de hospitalizaciones asociadas a la influenza ocurridas desde el inicio de la temporada (1 de octubre del 2023). Se actualizan por semana y se comparan con las estimaciones de hospitalizaciones asociadas a la influenza de final de temporada de las temporadas de influenza anteriores.

Limitaciones

Las estimaciones preliminares de la carga acumulativa de la influenza estacional están sujetas a varias limitaciones:

1. La tasa acumulativa de hospitalizaciones relacionadas con la influenza confirmada en laboratorio y notificadas durante la temporada puede ser una subestimación de la tasa al final de la temporada debido a las demoras en la identificación y notificación.
2. Las tasas de hospitalizaciones relacionadas con la influenza confirmada en laboratorio se ajustan según la frecuencia de realización de pruebas de detección de influenza y la sensibilidad de los ensayos de diagnóstico de la influenza. Sin embargo, los datos sobre las prácticas de pruebas durante la actual temporada de influenza no están disponibles en tiempo real. Para realizar estas estimaciones, los CDC utilizan los datos sobre las prácticas de pruebas de las últimas temporadas de influenza como referencia. Si se están realizando más pruebas en comparación con las temporadas de influenza anteriores, estas estimaciones pueden ser excesivas. Las estimaciones preliminares de la carga durante la temporada finalizan cuando se dispone de datos sobre las prácticas de pruebas actuales, y las estimaciones podrían disminuir si las pruebas de detección han aumentado.
3. Las estimaciones de consultas médicas por enfermedades similares a la influenza se basan en los datos de temporadas anteriores, que pueden no ser exactos si la gravedad de la enfermedad o los patrones de búsqueda de comportamiento de salud han cambiado.

Preguntas frecuentes

Cómo interpretar la carga acumulativa de la influenza

La carga acumulativa de la influenza es una estimación de la cantidad de personas que estuvieron enfermas, consultaron a un proveedor de atención médica, fueron hospitalizadas o fallecieron a causa de la influenza en un periodo determinado. Las estimaciones preliminares de la carga **durante la temporada** se proporcionan semanalmente durante la temporada de influenza cuando se dispone de datos suficientes para realizar una estimación, y las estimaciones preliminares **al final de la temporada** se dan al final de cada temporada de influenza. Las estimaciones preliminares de final de temporada se actualizarán con formato interanual y se consideran definitivas una vez que todos los datos están disponibles (por lo general dentro de los dos años de la estimación preliminar).

Cómo estiman los CDC la carga acumulativa de la influenza estacional

Las estimaciones preliminares de la carga acumulativa de influenza estacional tienen base en las tasas acumulativas en bruto de las hospitalizaciones relacionadas con la influenza confirmada en laboratorio, notificadas a través de la [Red de Vigilancia de Hospitalizaciones por Influenza \(FluSurv-NET\)](#), las cuales son ajustadas por la frecuencia de la realización de pruebas de influenza durante las temporadas recientes y la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico de la influenza. Las tasas de hospitalización luego se multiplican por una relación estimada previamente de hospitalizaciones y casos de

enfermedades sintomáticas, y la frecuencia de la búsqueda de atención médica para calcular las enfermedades sintomáticas, las consultas médicas, las hospitalizaciones y las muertes asociadas a la influenza estacional, respectivamente.

Por qué la estimación preliminar de la carga de influenza durante la temporada cambia cada semana

Las estimaciones de la carga de la influenza durante la temporada son preliminares y cambian cada semana a medida que se notifican a los CDC nuevas hospitalizaciones por influenza. Los nuevos informes incluyen nuevos ingresos o admisiones que ocurrieron durante la semana del informe semanal y los pacientes ingresados en las semanas previas que fueron reportados recientemente a los CDC.

Cómo se compara la cantidad estimada de hospitalizaciones a causa de la influenza en lo que va esta temporada con las estimaciones anteriores de hospitalizaciones a fines de temporada

Las estimaciones de esta página son preliminares, acumulativas y aumentarán a medida que avance la temporada. [Las estimaciones de hospitalizaciones relacionadas con la influenza de finales de temporada anteriores](#) (2010-2023) han variado de 100 000 a 710,000.

Última revisión: 21 de junio del 2024

Fuente: [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias \(NCIRD\)](#)