

Pacientes con catéteres



CONSEJO 1

Los catéteres tienen un mayor riesgo de infección. Consulte con su médico sobre la posibilidad de obtener una fístula o injerto en vez de un catéter.



CONSEJO 2

Aprenda cómo cuidar de su catéter en casa. No permita que el catéter se moje.



CONSEJO 3

Lave sus manos a menudo, especialmente antes y después de su tratamiento de diálisis.

6

CONSEJOS para prevenir infecciones de diálisis



CONSEJO 4

Conozca los pasos que sus profesionales de salud deben tomar cuando utilizan el catéter para el tratamiento.



CONSEJO 5

Conozca los signos y síntomas de una infección y qué debe hacer si cree que tiene una infección.



CONSEJO 6

Sepa qué debe hacer si tiene cualquier problema con el catéter.



Pacientes con fístulas o injertos



CONSEJO 1

Cuide su acceso vascular en casa. Evite rayarlo o rasguñarlo.



CONSEJO 2

Lave sus manos a menudo, especialmente antes y después de su tratamiento de diálisis.



CONSEJO 3

Lave o limpie su acceso vascular antes de su tratamiento.

6 CONSEJOS para prevenir infecciones de diálisis



CONSEJO 4

Conozca los pasos que sus profesionales de salud deben seguir cuando utilizan su acceso vascular para el tratamiento.



CONSEJO 5

Conozca los signos y síntomas de infección y qué debe hacer si cree que tiene una infección.



CONSEJO 6

Sepa qué debe hacer si tiene cualquier problema con su acceso vascular.

U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

