# Pacientes con catéteres

# 6 CONSEJOS para prevenir infecciones de diálisis

**U.S. Department of Health and Human Services**
Centers for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/ckd www.cdc.gov/dialysis/patient

## CONSEJO 1

Los catéteres tienen un mayor riesgo de infección. Consulte con su médico sobre la posibilidad de obtener una fístula o injerto en vez de un catéter.

## CONSEJO 2

Aprenda cómo cuidar de su catéter en casa. No permita que el catéter se moje.

## CONSEJO 3

Lave sus manos a menudo, especialmente antes y después de su tratamiento de diálisis.

## CONSEJO 4

Conozca los pasos que sus profesionales de salud deben tomar cuando utilizan el catéter para el tratamiento.

## CONSEJO 5

Conozca los signos y síntomas de una infección y qué debe hacer si cree que tiene una infección.

## CONSEJO 6

Sepa qué debe hacer si tiene cualquier problema con el catéter.

# Pacientes con fístulas o injertos

## CONSEJO 1

Cuide su acceso vascular en casa. Evite rayarlo o rasguñarlo.

## CONSEJO 2

Lave sus manos a menudo, especialmente antes y después de su tratamiento de diálisis.

## CONSEJO 3

Lave o limpie su acceso vascular antes de su tratamiento.

# 6 CONSEJOS para prevenir infecciones de diálisis

## CONSEJO 4

Conozca los pasos que sus profesionales de salud deben seguir cuando utilizan su acceso vascular para el tratamiento.

## CONSEJO 5

Conozca los signos y síntomas de infección y qué debe hacer si cree que tiene una infección.

## CONSEJO 6

Sepa qué debe hacer si tiene cualquier problema con su acceso vascular.

**U.S. Department of Health and Human Services**
Centers for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/ckd www.cdc.gov/dialysis/patient