

Médicaments destinés à la prévention du paludisme en voyage

Chloroquine (Aralen™)

Qu'est-ce que la chloroquine ?

La chloroquine (également connue sous le nom phosphate de chloroquine) est un médicament antipaludéen. Il est disponible aux États-Unis uniquement sur ordonnance. Il est commercialisé sous le nom de marque Aralen et également comme médicament générique. Il est disponible en comprimés de deux tailles : à 150 mg de base (250 mg de sel) et 300mg de base (500 mg de sel).

Vous devriez savoir qu'un comprimé à 150 mg de base est identique au comprimé à 250 mg de sel et qu'un comprimé à 300 mg de base est identique à un comprimé à 500 mg de sel. Il s'agit seulement de deux manières différentes de décrire la même chose.

La chloroquine peut être prescrite soit pour la prévention, soit pour le traitement du paludisme. Cette fiche fournit des informations concernant son utilisation à des fins de prévention contre l'infection au paludisme pendant un voyage.



Qui peut prendre de la chloroquine ?

La chloroquine peut être prescrite aux adultes et aux enfants de tous âges. Elle peut également être administrée sans risque aux femmes enceintes ainsi qu'aux mères allaitantes.

Qui ne doit pas prendre la chloroquine ?

Les personnes souffrant de psoriasis ne doivent pas prendre la chloroquine.

Comment dois-je prendre de chloroquine ?

Aussi bien les adultes que les enfants doivent prendre une dose de chloroquine par semaine en commençant au moins une semaine avant le déplacement dans la zone où la transmission du paludisme a lieu. Ils doivent prendre une dose par semaine une fois qu'ils y sont et pendant quatre semaines consécutives après avoir quitté la région concernée.

La dose hebdomadaire réservée aux adultes est de 300 mg de base (500 mg de sel).

Votre médecin aura déterminé la dose hebdomadaire qui convient à votre enfant, selon le poids de ce dernier. La dose réservée à l'enfant ne doit pas dépasser celle de l'adulte qui est de 300 mg de base (500 mg de sel) par semaine.


Où puis-je acheter de la chloroquine ?

Les médicaments antipaludéens sont disponibles aux États-Unis uniquement sur ordonnance. Les médicaments doivent être achetés en pharmacie avant le voyage plutôt que dans le pays de destination. L'achat de médicaments à l'étranger présente un risque : les médicaments peuvent être de mauvaise qualité, contaminés ou contrefaits et ne pas vous protéger contre le paludisme.

Dans quelles régions du monde la chloroquine peut-elle être utilisée pour la prévention du paludisme chez des voyageurs ?

Il existe peu d'endroits au monde où la chloroquine est encore efficace, notamment certaines parties d'Amérique centrale et des Caraïbes.

Le CDC note tous les endroits au monde qui sont propices à la transmission du paludisme et le type d'antipaludéens recommandé pour chaque région. Il est possible d'accéder à ces informations à l'aide de la carte du paludisme disponible sur le site du CDC : <http://www.cdc.gov/malaria/map/index.html>.



Chloroquine (Aralen™)

Le paludisme est une maladie grave qui peut causer la mort si elle n'est pas traitée immédiatement. Il est causé par un germe capable d'infecter un certain type de moustique qui se nourrit du sang des êtres humains.

Environ 1 500 cas de paludisme sont découverts chaque année aux États-Unis presque tous chez des sujets qui voyagent dans les régions du monde où le paludisme sévit.

Y aura-t-il une interaction entre la chloroquine et mes autres médicaments ?

Certains autres médicaments peuvent interagir avec la chloroquine et causer des problèmes pour vous. Votre médecin est chargé d'évaluer les autres médicaments que vous prenez pour s'assurer qu'il n'existe aucune interaction entre ces derniers et la chloroquine. Dans certains cas, les médicaments peuvent faire l'objet d'ajustement pour réduire l'interaction au minimum. Vous pouvez également demander à votre pharmacien de vérifier s'il existe des interactions de médicaments.

Quels sont les éventuels effets secondaires de la chloroquine ?

La chloroquine est un médicament relativement bien toléré. Les réactions négatives les plus fréquemment signalées sont les douleurs gastriques, la nausée, les vomissements et les maux de tête. Ces effets secondaires peuvent parfois être atténués en prenant la chloroquine lors des repas. La chloroquine peut également provoquer des démangeaisons chez certaines personnes.

Tous les médicaments peuvent comporter des effets secondaires. Les effets secondaires bénins, tels que la nausée, les vomissements occasionnels ou la diarrhée, ne nécessitent pas d'ordinaire l'arrêt des médicaments antipaludéens. Si vous êtes allergique à votre antipaludéen, consultez votre professionnel de la santé ; il existe d'autres médicaments antipaludéens.

Autres considérations

- Un bon choix pour des déplacements qui durent plus longtemps parce que vous devez prendre

votre médicament seulement une fois par semaine.

- Un surdosage de médicaments antipaludéens, surtout la chloroquine, peut provoquer la mort. Les médicaments doivent être conservés hors de portée des enfants et dans des flacons que ceux-ci ne peuvent ouvrir.

Pendant combien de temps peut-on utiliser la chloroquine en toute sécurité ?

Le CDC ne fixe pas de limite à l'utilisation de la chloroquine à titre préventif contre le paludisme. Lorsque la chloroquine est utilisée à des doses plus élevées pendant de nombreuses années, il apparaît une maladie oculaire rare appelée rétinopathie. Les personnes habituées à prendre de la chloroquine pendant plus de cinq ans doivent régulièrement faire examiner leurs yeux.

Pour tout renseignement complémentaire :

Consultez le site Web du CDC consacré au paludisme à l'adresse www.cdc.gov/malaria

Les professionnels de la santé qui ont besoin d'une assistance en matière de diagnostic ou de gestion des cas suspects de paludisme doivent appeler la ligne d'urgence mise sur pied par le CDC pour le paludisme : 770-488-7788 or 855-856-4713 gratuite (du lundi au vendredi, de 9h à 17h, heure de l'Est).

Pour les consultations d'urgence après les heures ouvrables, appelez le numéro : 770-488-7100 demandez à parler à un clinicien du Département CDC du paludisme.

Prévenir le paludisme

- Prendre un antipaludéen.
- Éviter les piqûres de moustiques.
- Si vous tombez malade, consultez immédiatement un médecin.