

# El VIH en los Estados Unidos: *un vistazo general*

Marzo 2015

## Datos breves

- Más de 1.2 millones de personas en los Estados Unidos tienen la infección por el VIH y casi 1 de cada 7 (14%) no sabe que tiene la infección.
- Los hombres gay, bisexuales y los que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH<sup>a</sup>), en especial los HSH de raza negra o afroamericanos, son los más gravemente afectados por el VIH.
- Por raza, las personas de raza negra o afroamericanos enfrentan la carga más pesada del VIH.


Los CDC estiman que 1 201 100 personas de 13 años o más viven con la infección por el VIH, incluidas 168 300 (14 %) que no saben que tienen la infección<sup>1</sup>. Durante la última década, el número de personas que viven con el VIH ha aumentado, mientras que el número anual de nuevas infecciones por el VIH se ha mantenido relativamente estable. Aun así el ritmo de nuevas infecciones se mantiene en un nivel demasiado alto, particularmente entre ciertos grupos.

**Incidencia del VIH** (nuevas infecciones): En general, la incidencia estimada de VIH se mantuvo estable durante los últimos años, con aproximadamente 50 000 nuevas infecciones por el VIH cada año<sup>2</sup>. Sin embargo dentro de las estimaciones generales, algunos grupos se ven más afectados que otros. Los HSH siguen teniendo la carga más alta de infección por el VIH, y entre las razas y grupos étnicos, los afroamericanos siguen siendo afectados desproporcionadamente.

**Diagnósticos de VIH** (diagnósticos nuevos independientemente de cuándo se produjo la infección o la etapa de la enfermedad al momento del diagnóstico): En el 2013, se estima que 47 352 personas fueron diagnosticadas con la infección por el VIH en los Estados Unidos. En ese mismo año, se estima que se diagnosticó SIDA a 26 688 personas. Desde que comenzó la epidemia, se estima que se diagnosticó SIDA a 1 194 039 personas en los Estados Unidos<sup>3</sup>.

**Muertes:** Se calcula que 13 712 personas con un diagnóstico de SIDA murieron en el 2012, y desde que comenzó la epidemia han muerto aproximadamente 658 507 personas en los Estados Unidos con un diagnóstico de SIDA<sup>3</sup>. La muerte de las personas con un diagnóstico de SIDA puede deberse a cualquier causa, es decir que la muerte puede estar relacionada o no con esta enfermedad.

## Estimaciones de infecciones nuevas por el VIH en los Estados Unidos para las poblaciones más afectadas de EE. UU., 2010



Fuente: CDC. Incidencia estimada del VIH en adultos y adolescentes en los Estados Unidos, 2007–2010. *HIV Surveillance Supplemental Report* 2012;17(4). En este gráfico no están reflejadas las subpoblaciones que representan el 2 % o menos.

## Por grupo de riesgo

**Los hombres gay, bisexuales y los que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)** de todas las razas y grupos étnicos siguen siendo la población más gravemente afectada por el VIH.

En el 2010, la cantidad estimada de nuevas infecciones por el VIH entre los HSH era de 29 800, lo que representa un aumento significativo del 12 % respecto de las 26 700 nuevas infecciones entre los HSH en el 2008<sup>2</sup>.

<sup>a</sup> Para evaluar el riesgo de la enfermedad, el término HSH se utiliza a menudo en lugar de gay, homosexual o bisexual, porque se refiere a un comportamiento de riesgo, en lugar de una identidad que puede o no puede ser ligada a un comportamiento.

Aunque los HSH representan alrededor del 4 % de la población masculina en los Estados Unidos<sup>4</sup>, en el 2010, los HSH representaron el 78 % de las nuevas infecciones por el VIH entre los hombres y el 63% de todas las nuevas infecciones<sup>2</sup>. Los HSH representaban el 54 % de todas las personas con la infección por el VIH en el 2011, el año más reciente del que se dispone de datos.<sup>1</sup>

En el 2010, los HSH de raza blanca seguían presentando el mayor número de nuevas infecciones por el VIH (11 200), por categoría de transmisión, seguidos de cerca por los HSH de raza negra (10 600)<sup>2</sup>.

El número estimado de nuevas infecciones por el VIH fue mayor entre los HSH en el grupo de edad más joven. En el 2010, el mayor número de nuevas infecciones por el VIH (4800) entre los HSH se presentó entre los HSH jóvenes de raza negra o afroamericanos de 13 a 24 años. Los HSH jóvenes de raza negra representaron el 45% de las nuevas infecciones por el VIH entre los HSH de raza negra y el 55 % de las nuevas infecciones por el VIH entre los HSH en general<sup>2</sup>.

Desde que comenzó la epidemia, se estima que 311 087 HSH con diagnóstico de SIDA murieron, incluida una cifra estimada de 5380 en el 2012<sup>3</sup>.

**Los heterosexuales y los usuarios de drogas inyectables** también continúan siendo afectados por el VIH.

Desde que comenzó la epidemia, han muerto alrededor de 92 613 personas con SIDA, que fueron infectadas a través de relaciones sexuales heterosexuales, incluyendo una cifra estimada de 4550 en el 2012<sup>3</sup>.

Las nuevas infecciones por el VIH en las mujeres se atribuyen principalmente al contacto heterosexual (84 % en el 2010) o al uso de drogas inyectables (16 % en el 2010). Las mujeres representaron el 20 % de las nuevas infecciones por el VIH estimadas en el 2010 y el 23 % de las personas que vivían con la infección por el VIH en el 2011<sup>1,2</sup>. Las 9500 nuevas infecciones entre mujeres en el 2010 reflejan una disminución significativa de 21 % con respecto a las 12 000 nuevas infecciones registradas en ese grupo en el 2008<sup>2</sup>.

Los usuarios de drogas inyectables representaron el 8 % de las nuevas infecciones por el VIH en el 2010 y el 15 % de las personas que vivían con el VIH en el 2011<sup>1,2</sup>.

Desde que comenzó la epidemia, casi 186 728 usuarios de drogas inyectables con SIDA han muerto, incluida una cifra estimada de 3514 en el 2012<sup>3</sup>.

## Por raza o grupo étnico

**Las personas de raza negra o afroamericanos** siguen teniendo la carga más fuerte del VIH en comparación con otras razas y grupos étnicos.

Las personas de raza negra representan aproximadamente el 12 % de la población de los EE. UU., pero representaron el 44 % de las nuevas infecciones por el VIH en el 2011. También representaron el 41 % de las personas que vivían con la infección por el VIH en el 2011<sup>1,2</sup>.

Desde que comenzó la epidemia, han muerto más de 270 726 personas de raza negra con SIDA, incluida una cifra estimada de 6540 en el 2012<sup>3</sup>.

**Los hispanos o latinos también** se ven afectados en forma desproporcionada por el VIH.

Los hispanos o latinos representaron el 16 % de la población, pero representaron el 21 % de las nuevas infecciones por el VIH en el 2010<sup>2</sup>. Los hispanos o latinos representaron el 20 % de las personas que vivían con la infección por el VIH en el 2011<sup>1</sup>.

Las desigualdades persisten en la tasa estimada de nuevas infecciones por el VIH entre los hispanos o latinos. En el 2010, la tasa de nuevas infecciones por el VIH entre los hombres latinos era 2.9 veces más alta que la tasa entre los hombres de raza blanca, y la tasa de nuevas infecciones entre las mujeres latinas era 4.2 veces más alta que entre las mujeres de raza blanca<sup>2</sup>.

Desde que comenzó la epidemia, han muerto alrededor de 100 888 hispanos o latinos con diagnóstico de SIDA, incluidos 2155 en el 2012<sup>3</sup>.

## Referencias

<sup>1</sup> CDC. Monitoring selected national HIV prevention and care objectives by using HIV surveillance data —United States and 6 dependent areas—2012. *HIV Surveillance Supplemental Report* 2014;19(No.3). Published November 2014.

<sup>2</sup> CDC. Estimated HIV incidence in the United States, 2007–2010. *HIV Surveillance Supplemental Report* 2012;17(No. 4). Published December 2012.

<sup>3</sup> CDC. *HIV Surveillance Report*, 2013; vol. 25. Published February 2015.

<sup>4</sup> Purcell D, Johnson CH, Lansky A, et al. Estimating the population size of men who have sex with men in the United States to obtain HIV and syphilis rates. *Open AIDS Journal* 2012;6 (Suppl 1: M6): 98-107.

<sup>5</sup> CDC. Estimated lifetime risk for diagnosis of HIV infection among Hispanics/Latinos—37 states and Puerto Rico, 2007. *MMWR* 2010;59 (40):1297-1301.

### Recursos adicionales

**CDC-INFO**  
1-800-CDC-INFO (232-4636)  
[www.cdc.gov/info](http://www.cdc.gov/info)

**Sitio web de los CDC sobre el VIH**  
[www.cdc.gov/hiv/spanish/default.html](http://www.cdc.gov/hiv/spanish/default.html)

**Campaña de los CDC Actúa contra el SIDA**  
[www.cdc.gov/actagainstaids/spanish/index.html](http://www.cdc.gov/actagainstaids/spanish/index.html)