



Qué sabemos

- ◆ El virus del Zika puede transmitirse de un hombre que padezca la enfermedad a sus parejas sexuales.
- ◆ En los casos conocidos de transmisión sexual, los hombres tenían síntomas del zika. A partir de estos casos, sabemos que el virus puede transmitirse cuando el hombre presenta síntomas, antes de la aparición de los síntomas y después de que desaparecen.
- ◆ El virus permanece en el semen durante más tiempo que en la sangre.

Qué no sabemos

- ◆ Cuánto tiempo puede permanecer el virus del Zika en el semen de hombres infectados o cuánto tiempo puede transmitirse a través de las relaciones sexuales.
- ◆ Si los hombres que padecieron el zika y nunca presentaron síntomas pueden transmitir el zika a través de las relaciones sexuales, o si su semen puede contener el virus.
- ◆ Si una mujer puede transmitir el virus del Zika a sus parejas sexuales.



Lo que debe saber acerca del zika y las relaciones sexuales

Debido a la relación que existe entre el zika y las malformaciones congénitas, tome medidas para evitar que su pareja se infecte con el zika durante su embarazo.

Siempre que tenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales (boca a pene), use condón de principio a fin, durante el embarazo de su pareja.



No mantenga relaciones sexuales con su pareja durante el embarazo.



Si piensa que puede tener o ha tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica

- ◆ Sobre sus síntomas.
- ◆ Si ha tomado medidas para evitar las picaduras de mosquitos.
- ◆ Si tuvo relaciones sexuales sin condón con su pareja embarazada.