Resposta do CDC ao **zika**

Zika e sexo: Informações para homens que visitaram recentemente áreas com zika e têm parceiras grávidas

O que sabemos

- O zika vírus pode ser transmitido por um homem com zika a suas(seus) parceiras(os) sexuais.
- Nos casos conhecidos de transmissão sexual, os homens tinham sintomas do zika vírus. Com base nesses casos, sabemos que o vírus pode ser transmitido quando o homem tem os sintomas, antes do começo dos sintomas e depois do desaparecimento dos sintomas.
- O vírus pode sobreviver no sêmen por mais tempo do que no sangue.

O que não sabemos

- Quanto tempo o zika vírus pode permanecer no sêmen de homens infectados ou ser transmitido pelo ato sexual.
- Se homens infectados pelo zika que nunca desenvolveram sintomas podem ter o zika vírus no sêmen ou transmitir o zika pelo ato sexual.
- Se uma mulher pode transmitir o zika vírus a seus parceiros sexuais.

O que você deve saber sobre zika e relação sexual

Como o zika pode causar alguns defeitos congênitos, tome medidas para impedir que sua parceira contraia zika durante a gravidez.

Toda vez que tiver relação sexual vaginal, anal ou oral (boca no pênis) durante a gravidez de sua parceira, use um preservativo do início ao fim.

OU

Não tenha relação sexual com sua parceira durante a gravidez.

Se você acha que pode ter ou teve zika, informe ao seu médico ou profissional de saúde

- Sobre os seus sintomas.
- Se tomou medidas para prevenir picadas de mosquitos.
- Se você teve relação sexual sem o uso de preservativo com sua parceira grávida.

U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/zika

5 de junho de 2016