

Zika vírus

Contagem de casos nos EUA em 2016

[2017](#) | 2016 | [2015](#)

Dados provisórios em 10 de maio de 2017

Em 2016, a doença do zika vírus tornou-se uma condição que deve ser notificada em âmbito nacional. Os casos são reportados ao CDC pelos departamentos de saúde estaduais, territoriais e locais usando definições de caso padrão. Esta página da web contém dados provisórios reportados ao ArboNET de **2016**.

Estados dos EUA

- 5.102 casos sintomáticos de doença do zika vírus reportados*
 - 4.830 casos em viajantes que retornam de áreas afetadas
 - 224 casos contraídos por meio de possível transmissão local por mosquito na Flórida (N=218) e Texas (N=6)
 - 48 casos contraídos por outras vias, inclusive transmissão sexual (N=46), transmissão em laboratório (N=1) e de pessoa a pessoa por via desconhecida (N=1)

Territórios dos EUA


- 36.079 casos sintomáticos de doença do zika vírus reportados*
 - 142 casos em viajantes que retornam de áreas afetadas
 - 35.937 casos contraídos por transmissão por mosquito local presumida
 - 0 casos contraídos por outras vias†

Notas

*Exclui casos de doença congênita. Os dados comunicados ao registro de gravidez com zika nos EUA para os resultados de gestações com evidência laboratorial de possível infecção pelo zika vírus nos Estados Unidos estão disponíveis em [Resultados de gestações com evidência laboratorial de possível infecção pelo zika vírus nos Estados Unidos](#).

†Casos transmitidos sexualmente não são reportados para os territórios dos EUA porque, com transmissão local do zika vírus, não é possível determinar se ocorreu infecção por transmissão sexual ou por mosquito.

Casos por estado e território



Casos sintomáticos de doença do zika vírus confirmados em laboratório e doadores de sangue possivelmente virêmicos notificados ao ArboNET por estados e territórios – Estados Unidos, 2016 (dados provisórios de 10 de maio de 2017)

	Casos de doença sintomática*		Doadores de sangue com suspeita de viremia†	
	(N=5.102)		(N=37)	
Estados	Nº	(%)	Nº	(%)
Alabama	37	(1)	0	(0)
Arizona	54	(1)	1	(3)
Arkansas	13	(<1)	0	(0)
Califórnia	421	(8)	4	(11)
Colorado	55	(1)	0	(0)
Connecticut	58	(1)	0	(0)
Delaware	17	(<1)	0	(0)
Distrito de Colúmbia	39	(1)	0	(0)
Flórida‡	1,115	(22)	23	(62)
Geórgia	107	(2)	0	(0)
Havaí	11	(<1)	0	(0)
Idaho	4	(<1)	0	(0)
Illinois	103	(2)	0	(0)

Indiana	49	(1)	0	(0)
Iowa	26	(1)	1	(3)
Kansas	20	(<1)	0	(0)
Kentucky	32	(1)	0	(0)
Louisiana	38	(1)	0	(0)
Maine	12	(<1)	0	(0)
Maryland	130	(3)	0	(0)
Massachusetts	118	(2)	1	(3)
Michigan	67	(1)	0	(0)
Minnesota	67	(1)	0	(0)
Mississippi	23	(<1)	0	(0)
Missouri	35	(1)	0	(0)
Montana	9	(<1)	0	(0)
Nebraska	13	(<1)	0	(0)
Nevada	22	(<1)	1	(3)
New Hampshire	11	(<1)	0	(0)
Nova Jérsei	180	(4)	0	(0)
Novo México	10	(<1)	0	(0)
Nova Iorque	1,001	(20)	2	(5)
Carolina do Norte	97	(2)	0	(0)
Dakota do Norte	3	(<1)	0	(0)
Ohio	83	(2)	0	(0)
Oklahoma	29	(1)	0	(0)
Oregon	47	(1)	0	(0)
Pensilvânia	175	(3)	0	(0)
Rhode Island	54	(1)	0	(0)
Carolina do Sul	59	(1)	0	(0)
Dakota do Sul	3	(<1)	0	(0)
Tennessee	61	(1)	0	(0)
Texas‡	312	(6)	4	(11)
Utah	21	(<1)	0	(0)
Vermont	11	(<1)	0	(0)
Virgínia	108	(2)	0	(0)
Washington	69	(1)	0	(0)
Virgínia Ocidental	11	(<1)	0	(0)
Wisconsin	60	(1)	0	(0)
Wyoming	2	(<1)	0	(0)

	Casos de doença sintomática*		Doadores de sangue com suspeita de viremia†	
	(N=36.079)		(N=322)	
Territórios	Nº	(%)	Nº	(%)
Samoa Americana	129	(<1)	0	(0)
Porto Rico	34,963	(97)	322	(100)
Ilhas Virgens Americanas	987	(3)	0	(0)

Notas

*Inclui casos reportados confirmados e prováveis de doença causada pelo zika vírus de acordo com as [definições de caso do CSTE](#).

† Doadores de sangue com suspeita de viremia são pessoas que não relataram nenhum sintoma no momento da doação de sangue, mas cujo sangue testou positivo quando examinado quanto à presença de RNA do zika vírus pela agência de coleta de sangue. Alguns doadores de sangue com suspeita de viremia desenvolvem sintomas após a doação ou podem ter tido sintomas no passado. Essas pessoas podem ser reportadas como casos de doença causada pelo zika vírus e como doadores de sangue com suspeita de viremia.

‡Inclui 218 casos na Flórida e 6 casos no Texas que foram contraídos por meio de possível transmissão local por mosquito.