

肉禽加工业员工：

预防员工感染 COVID-19 的关键策略

可访问版本：<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html>

雇主应对其工作场所可能传播 COVID-19 的风险因素进行评估。使用预防指南制定一份健康安全计划。经常与州和/或当地的公共卫生官员和职业安全与健康专家联系，以获取有关您所在地区的 COVID-19 的相关且最新的信息。

- **尽量使员工之间保持至少 6 英尺距离（鼓励社交隔离）。**使用实质性屏障或分区、减少人员或调整工作场所或工作流程，进而增加员工之间的距离。添加额外的上下班打卡站，将休息室的椅子分隔开，并在室外添加帐篷用于休息。



- **鼓励生病员工待在家里。**制定政策，从而使患病的员工呆在家里，而不会失去收入。确保员工了解这些政策。与职业医疗专家联手，为可能与 COVID-19 有关的风险较高的人员制定政策。



- **增加清洁与消毒的频率，并确保在共享空间有足够的通风。**至少与员工更换工作场所一样频繁地清洁并消毒工具或其他设备。在每个班次结束时，以至于更加频繁地消毒工作场所、休息室、巴士或面包车（如用过）中经常被触碰的表面。



重新定向或移除风扇，以防止空气从一名员工直接吹向另一名员工。如果风扇已移除，雇主应采取措施防止 **高温导致的危害**。

- **鼓励员工实施社交隔离。**错开休息时间和到岗和离岗时间。在员工可能聚集的地方贴示醒目提示（地板标记和告示），其中包括工作区域、休息区域、更衣室、走廊或楼道和出入口区域。鼓励员工避免上下班拼车。如果必须拼车，尽量限制每辆车的乘客人数。这可能需要使用更多车辆。鼓励在共享面包车或汽车空间中，**佩戴口罩**。

- **在员工进入工作场所之前，对其进行潜在的 COVID-19 症状筛查。**就筛查流程事宜，向州和当地卫生官员以及职业医疗专业人士进行咨询。将出现症状的员工立即送回家，鼓励其在家里进行自我隔离（如可能），并联系医护人员。提供有关何时可以返岗的信息。

- **考虑提供布制口罩和/或面罩。**确保正确佩戴口罩（紧密地遮盖口鼻）。提供具有多层织物的可洗式口罩。请在口罩潮湿、脏污、或污染时更换。口罩不是用来替代建议的或要求的个人防护装备，例如呼吸器或医用口罩。培训员工如何在无污染自己的前提下穿脱个人防护装备。在每个班次使用后，清洁并消毒面罩。确保面罩能够遮盖住下巴，并包住脸部两侧。



- **提倡正确的手部卫生。**提供自来水、肥皂、纸巾和垃圾桶（如有，非接触式垃圾桶）。让员工洗手至少 20 秒。在多个地点放置洗手站或净手站。提供至少含有 60% 的酒精浓度的酒精性洗手液。



- **对员工和主管进行如何降低 COVID-19 传播的教育。**覆盖关于生病时待在家中，社交距离，佩戴口罩的方法和适当的 **手部卫生** 等主题。使用易于理解的形式和适当的语言提供材料。CDC 提供可下载的海报。



[cdc.gov/coronavirus](https://www.cdc.gov/coronavirus)